

Mélanges pour les prairies de fauche (longue durée), avec fleurs de prairie

Composition et densité du semis (grammes / are)

Espèce	Prairies à fromental		Prairies à avoine jaunâtre	Prairies à brome dréssé
	utilisation peu intensive ←----		----→ utilisation extensive	
	(2 à 3 utilisations par année)		(1 à 2 utilisations par année)	
Ecotypes Suisses uniquement!	Mst Salvia sec	Mst Humida humide, pas ombrageux	Mst Montagna montagneux	SM Broma Sec et sol maigre
Légumineuses				
Lotier corniculé, <i>Lotus corniculatus</i>	1	1.7	4	0.8
Luzerne lupuline, <i>Medicago lupulina</i>	1	1.8	2.25	0.8
Trèfle violet, <i>Trifolium pratense</i>	0.4	0.3	0.05	0.15
Gesse des prés, <i>Lathyrus pratensis</i>	0.4	0.6	0.35	0.3
Vesce des haies, <i>Vicia sepium</i>	0.4	0.5	0.3	
Esparcette à feuilles de vesce, <i>Onobrychis vicifolia</i>	2.7		1.8	1.8
Anthyllide vulnéaire, <i>Anthyllis vulneraria</i>	0.5		1.2	1.6
Vesce cracque, <i>Vicia cracca</i>			0.3	0.15
Trèfle des montagnes, <i>Trifolium montanum</i>				0.15
Hippocrévide à toupet, <i>Hippocrepis comosa</i>				0.4
Graminées				
Dactyle, <i>Dactylis glomerata</i>	7	7	8	
Fétuque des prés, <i>Festuca pratensis</i>	21	25	25	11
Pâturin des prés, <i>Poa pratensis</i>	5.3	4	12.5	10
Fétuque rouge, <i>Festuca nigrescens</i>	17	23	25	23
Fromental, <i>Arrhenatherum elatius</i>	16	21		
Avoine jaunâtre, <i>Trisetum flavescens</i>	1.1	2	3.5	2
Agrostide vulgaire, <i>Agrostis capillaris</i>			1	
Crételle des prés, <i>Cynosurus cristatus</i>			20	
Brome dressé, <i>Bromus erectus</i>	26			45
Agrostide géante, <i>Agrostis gigantea</i>		1		
Vulpin des prés, <i>Alopecurus pratensis</i>		11		
Koélérie à crête, <i>Koeleria pyramidata</i>				3.3
Avoine pubescente, <i>Helictotrichon pubescens</i>	5.3	5	4	5.6
Flouve odorante, <i>Anthoxanthum odoratum</i>	4.2	4	4	3.4
Brize intermédiaire, <i>Briza media</i>	2.1	2	2	1.7
Fleurs des prairies				
Centaurée jacée, <i>Centaurea jacea</i>	0.15	0.6	0.35	0.2
Liondent hispide, <i>Leontodon hispidus</i>	0.3	0.35	0.2	0.35
Marguerite, <i>Leucanthemum vulgare</i>	0.3	0.4	0.5	0.15
Plantain lancéolé, <i>Plantago lanceolata</i>	0.1	0.25	0.15	0.1
Salsifis des prés, <i>Tragopogon orientalis</i>	1.6	2.3	1.25	1.3
Grand boucage, <i>Pimpinella major</i>	0.2	0.4	0.2	
Cumin des prés, <i>Carum carvi</i>	0.6	1.2	0.5	
Crépide bisanuelle, <i>Crepis biennis</i>	0.1	0.05	0.15	
Campanule étalée, <i>Campanula patula</i>	0.03	0.05		0.03
Silène vulgaire, <i>Silene vulgaris</i>	0.1		0.1	0.1
Sauge des prés, <i>Salvia pratensis</i>	1.1		1	0.7
Knautie des champs, <i>Knautia arvensis</i>	1	1		1.5
Epiaire officinale, <i>Stachys officinalis</i>	0.2	0.7		0.4
Brunelle vulgaire, <i>Prunella vulgaris</i>		0.15	0.1	
Silène dioïque, <i>Silene dioica</i>		0.7	0.15	
Picride fausse épervière, <i>Picris hieracioides</i>	0.2			0.1
Centaurée scabieuse, <i>Centaurea scabiosa</i>	0.4			0.5
Campanule à feuilles rondes, <i>Campanula rotundifolia</i>	0.07			0.07
Carotte, <i>Daucus carota</i>	0.1			0.15
Primevère du printemps, <i>Primula veris</i>	0.15			0.2
Petite pimprenelle, <i>Sanguisorba minor</i>	1.6			1.1
Sariette vulgaire, <i>Clinopodium vulgare</i>	0.1			0.05
Scabieuse colombarie, <i>Scabiosa columbaria</i>	0.2			0.2
Plantain moyen, <i>Plantago media</i>			0.1	0.05
Total prairie à fleurs	120	120	120	120

Des espèces supplémentaires sont ajoutées en très faibles quantités dans les mélanges suivants:

Mst Humida

Silène fleur-de-coucou, *Silene flos-cuculi*; Cirse maraîcher, *Cirsium oleraceum*; Cardamine des prés, *Cardamine pratensis*; Myosotis des marais, *Myosotis scorpioides*; Pimprenelle officinale, *Sanguisorba officinalis*; Primevère élevée, *Primula elatior*.

Mst Broma

Renoncule bulbeuse, *Ranunculus bulbosus*; Brunelle à grandes fleurs, *Prunella grandiflora*; Potentille du printemps, *Potentilla neumanniana*; Campanule agglomérée, *Campanula glomerata*; Campanule raiponce, *Campanula rapunculus*; Epervière piloselle, *Hieracium pilosella*; Gaillet jaune, *Galium verum*; Silène penché, *Silene nutans*; Héliantheme nummulaire, *Helianthemum nummularium*; Thym faux pouliot, *Thymus pulegioides*.