

Auswirkungen bei unpassendem Zeitpunkt der Futterbergung

Konser- vierungsart	Trockenheits- grad	Auswirkungen	Tipps!
Dürrfutter	Zu feucht	• Verdichtungsstellen auf dem Stock → Probleme bei der Belüftung • Abnormal starke Nacherwärmung (►«Heugärung») → ►Gehaltsverluste, erhöhtes Risiko von Stockbrand • Futter verschimmelt	Heu und Emd können auch schon bei knapp 50% TS auf den Belüftungsstock gebracht werden, wenn Warmluft erzeugt wird (Sonnendach, Ofen) oder ein Luftentfeuchter zum Einsatz kommt.
	Zu trocken	• Erhöhte ►Bröckelverluste	
Silage	Zu feucht	• ►Gärsaftverluste • Risiko von ►Fehlgärungen	Stimmt der TS-Gehalt nicht ganz, kann bis zu einem gewissen Grad mit ►Siliermitteln nachgeholfen werden. Je trockener die Anwelksilage beim Einführen, umso kürzer muss sie gehäckselt werden, damit sie korrekt verdichtet werden kann.
	Zu trocken	• Risiko von verbleibender Luft im Futter und undichten Abschlüssen → eher Schäden durch ►Schimmel oder ►Nachgärungen (Erwärmung)	