

Il tipo d'intervento necessario dipende dalla gravità della situazione


Situazione iniziale			Misure di ripristino		
Pressione delle malerbe		Livello di infestazione	Cotica erbosa	Lotta indiretta (prevenzione)	Lotta diretta (cura)
Livello 1		Livello 1 Infestazione assente o trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Cotica erbosa equilibrata / ricca in graminacee > 30-50% buone graminacee Malerbe assenti o trascurabili Cotica erbosa fitta e portante 	<ul style="list-style-type: none"> Continuare con la gestione corrente Cure culturali mirate Consentire, ogni tanto, la disseminazione delle buone graminacee cespitose Traseminarne saltuariamente 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenere sotto controllo le poche malerbe presenti estirpandole singolarmente Impedirne disseminazione e propagazione
		Livello 2 Infestazione di media gravità con effetti negativi misurabili	<ul style="list-style-type: none"> Cotica erbosa ricca di <i>altre erbe</i> 15-30% di buone graminacee Con trifogli e <i>altre erbe</i> foraggere, ma anche <i>altre erbe</i> di scarso valore foraggere e malerbe Cotica erbosa piuttosto lacunosa e poco portante 	<ul style="list-style-type: none"> Individuare le cause di diffusione delle malerbe Adattare la gestione alle condizioni stazionali Sfalcio pascolo e/o pascolo primaverile precoce Traseminarne ripetutamente PT: distruggere la cotica e cambiare coltura 	<ul style="list-style-type: none"> Traseminarne ripetutamente Lotta meccanica o diserbo chimico <i>pianta per pianta</i> o su singoli focolai Diserbo di superficie con erbicidi selettivi
		Livello 3 Cotica erbosa irrecuperabile	<ul style="list-style-type: none"> Cotica degradata < 15% di buone graminacee Diffusa presenza di malerbe Cotica erbosa infeltrita o molto lacunosa (poco portante) Presenza di molti semi di malerbe nel suolo 	<ul style="list-style-type: none"> Adattare la gestione alle condizioni stazionali (in ottica futura), in modo da assicurare la presenza stabile di una cotica erbosa fitta, portante e soprattutto produttiva 	<p>Distruzione della cotica erbosa e rifacimento del prato/pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aratura/fresatura e risemina Diserbo di superficie con erbicidi non selettivi (vietato in agricoltura biologica!) e risemina



Graminacee foraggere



Leguminose e *altre erbe* foraggere



Altre erbe di scarso valore foraggere e malerbe