

## Caractéristiques des graminées (Partie 1)

Graminées	Humidité			Fertilisation		Utilisation		Intensité d'exploitation			Bouche-trous	Valeur fourragère			
	humide	frais	sec	élevée	moyenne	faible	Fauche	Pature	intensif	mi-intensif	peu intensif	bonne	moyenne	faible	
<b>Agrostide capillaire</b> <i>Agrostis capillaris</i>		●			○	○	●	○			●	●		●	
<b>Agrostide stolonifère</b> <i>Agrostis stolonifera</i>	●	●		●	●		○	●	●	●	●		○	○	○
<b>Vulpin des prés</b> <i>Alopecurus pratensis</i>	●	○	○	●	○		●		●	●			●	○	
<b>Flouve odorante</b> <i>Anthoxanthum odoratum</i>					●	●	●			●	●	○	●	●	○
<b>Fromental</b> <i>Arrhenatherum elatius</i>		●	○		●	○	●			●			●	○	
<b>Brize intermédiaire</b> <i>Briza media</i>	○		●			●	●				●			●	
<b>Brome dressé</b> <i>Bromus erectus</i>			●			●	●				●			○	●
<b>Brome mou</b> <i>Bromus mollis</i>												●	○		●
<b>Crételle des prés</b> <i>Cynosurus cristatus</i>		●			●			●		●	●		●		
<b>Dactyle</b> <i>Dactylis glomerata</i>	○	●	○	●	●		●			●	○		●		
<b>Chiendent</b> <i>Elymus repens</i>		●		●			●	●	○	●				○	●
<b>Fétueque élevée</b> <i>Festuca arundinacea</i>	○	●	●	○	●		●	○ <sup>1</sup>		●			● <sup>2</sup>		● <sup>1</sup>

Légende:

● = valable

○ = partiellement valable

<sup>1</sup> Forme sauvage

<sup>2</sup> Forme sélectionnée