

Caratteristiche delle graminacee (parte 1)

Graminacee	Caratteristiche idriche del suolo			Livello di concimazione			Sfruttamento		Intensità di gestione				Specie «tappabuchi»	Valore foraggiero		
	umido	fresco	siccioso	elevata	media	bassa	sfalcio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva		buono	scarsa	pessimo
Agrostide rossa <i>Agrostis capillaris</i>		●			○	○	●	○		●	●				●	
Agrostide stolonifera <i>Agrostis stolonifera</i>	●	●		●	●		○	●	●	●	●		●	○	○	○
Coda di volpe <i>Alopecurus pratensis</i>	●	○	○	●	○		●	●	●	●			●	○	○	
Paleo odoroso <i>Anthoxanthum odoratum</i>							●	●			●	●	○	●	●	○
Erba altissima <i>Arrhenatherum elatius</i>	●	○			●	○	●				●			●	○	
Sonaglini <i>Briza media</i>	○	●					●	●						●		●
Bromo eretto <i>Bromus erectus</i>		●					●	●						○		●
Bromo peloso <i>Bromus mollis</i>													●	○		●
Coda di cane <i>Cynosurus cristatus</i>		●			●			●	●	●	●			●		●
Erba mazzolina <i>Dactylis glomerata</i>	○	●	○	●	●		●		●	●			●			
Gramigna comune <i>Elymus repens</i>		●		●			●	●	○	●				○		●
Festuca arundinacea <i>Festuca arundinacea</i>	○	●	●	○	●		●	○ ¹		●			● ²		● ¹	

Legenda:

● = applicabile

○ = in parte applicabile

¹ Ecotipo locale

² Varietà selezionata