Attention: pour déterminer, choisir toujours des jeunes pousses, bien développées, avec 2 à 4 feuilles!
Juste avant l'épiaison, il faut sortir l'inflorescence et travailler avec la clef pour les graminées à l'épiaison!

© edition-lmz, 2019

①a Feuilles étroites

< 2 mm

Feuilles fragiles, vert-jaune clair, minces, face inférieure brillante

Pâturin commun
Feuilles coniques, fragiles, vert-jaune. Trace de ski, visible avec loupe. En 1ère coupe feuilles supérieures plus larges.

Feuilles étroites, dures, vert foncé

Fétuque rouge
Feuilles dures avec rainures. Les pousses se laissent arracher séparément. Espèces voisines: p.ex. fétuque ovine avec feuilles bleu-vert.

Nard raide
Feuilles raides, très dures, gris-vert. Les pousses ne se laissent pas arracher isolément. Les touffes sont ancrées très fortement dans le sol. On observe souvent des parties de touffes desséchées de l'année précédente.

①b Feuille avec trace de ski

Feuilles sans poils

Pâturin annuel
La plante fleurit déjà à 5–10 cm, c'est-à-dire toujours. Feuilles courtes, souvent ridées. Face inférieure non brillante.

Pâturin des prés
bords des feuilles parallèles. Feuilles longues, raides, vert foncé avec pointe de canoé. Ligule courte et coupée.

Pâturin commun
Feuilles coniques, fragiles. Ligule pointue. En 1ère coupe, formes très variées.

Feuilles poilues

Avoine pubescente
Bords des feuilles parallèles. Feuilles avec pointe de canoé. Feuille très longue (seulement au stade végétatif!)

② Feuilles ou / et gaines nœuds poilus

Avec

Chiendent
Oreillettes étroites. Feuilles dures, raides, vissées, larges et coniques. Avec stolons souterrains.

Sans oreillettes

Poils 0,5 mm

Houlque laineuse
Partout velouté = poils denses et courts. Gaine inférieure avec nervures violettes. Feuilles gris-vert clair. Sans stolons.

partout

Poils > 1 mm aussi présents

Irrégulièrement poilu

Houlque molle
Poils aux nœuds dirigés vers le bas. Avec stolons souterrains.

Flouve odorante
Base de feuille avec poils en touffes. Reste glabre.

Fromental
Feuilles en forme d'épées dressées, pas ou peu vissées. Face sup. des feuilles poilue. Ligule courte, blanche, dentelée, souvent déchirée. Dépasse les autres plantes.

Brachypode penné
Feuilles vert-jaune clair, rétrécies à la base. Forme des taches claires dans des surfaces sous-exploitées (grâce aux stolons).

Feuille

jaune clair

Régulièrement poilu

Brome dressé
Bords des feuilles ciliés régulièrement. Feuilles longues, avec bords parallèles (seulement à l'état végétatif!)

Feuille

Brome mou
Gaines fortement poilues, tige épaisses. Taches brun-violet sur la gaine inférieure. Meurt après la 1ère coupe.

Avoine jaunâtre
Pousses minces. Poils sur la gaine dirigés vers le bas. Ligule courte, blanche, dentelée. Feuilles vissées à gauche (vu à partir de la pointe).

Gaine

③ Face inférieure de la feuille très différente de la face supérieure

Feuilles vert normal (pas gris-vert)

Face sup. avec rainures nettes

Face inférieure en gén. brillante

Feuilles étroites (3 à 4 mm, plus larges à l'épiaison)

Feuilles parallèles

Ray-grass anglais
Face inférieure fortement brillante. Rainure du milieu enfoncée. Coupe de la feuille = «corbeau» (3 lignes). Gaine inférieure rouge (enlever les parties mortes!). Carène visible jusqu'à la pointe de la feuille. Tige ovale.

1 2 3

Canche gazonnante
Lignes blanches, transparentes. Grandes touffes.

Crételle
Face inf. de la feuille légèrement brillante. Gaine inf. brun-jaune. Bords de feuille avec encoche à une place. Petites touffes denses.

Feuilles larges de 5 à 10 mm

Feuilles coniques

Ray-grass Italien
Ligule transparente, environ 2 mm de long, visible de côté. Pointes des feuilles en général pendantes. Dépasse les autres graminées. Face inférieure très brillante.

Fétuque des prés
Ligule courte, max. 1 mm, verdâtre, ferme, non visible de côté. Feuilles vert sale. 2ème feuille du haut presque horizontale. Face inf. de la feuille peu brillante.

Fétuque roseau / élevée
Voir fétuque des prés. En plus: Plante grossière, dure et rugueuse. Base du limbe avec poils fins (loupe). Grandes touffes grossières. Variétés plus fines.

Vulpin des prés
Feuille très longue, conique. Ligule 1–3 mm, robuste, verdâtre. Face supérieure de la feuille avec rainures irrégulières, mais bien visibles, face inférieure non brillante.

④ Face inférieure semblable à la face supérieure de la feuille

Feuilles vert mat à vert gris

Face sup. lisse à légèrement rainurée

Face inf. de la feuille sans rainures, mate.

Tiges

Dactyle
Feuilles typiquement vert gris (à l'état très jeune jaune vert clair). Pousses plates.

Carène

Tiges

Avec

Chiendent
Oreillettes étroites et pointures. Feuilles dures, raides, vissées, larges et coniques. Avec stolons souterrains.

Sans oreillettes

Feuille peu ou pas rainurée

Fléole des prés
Feuille avec bords ondulés, gris-vert bleuâtre, «cirée». Ne dépasse pas les autres graminées. Ligule courte, blanche, dentelée, souvent avec dents latérales. Base de la tige enflée.

souvent avec dents latérales

Ligule blanche

Fromental
Feuilles en forme d'épées dressées, pas ou peu vissées, vers la lumière avec lignes jaune-vert. Ligule courte, blanche, dentelée, souvent déchirée. Dépasse les autres graminées.

Face supérieure nettement rainurée

Vulpin des prés
Feuille très longue, conique. Ligule 1–3 mm, robuste, verdâtre. Face supérieure de la feuille avec rainures irrégulières, mais bien visibles, face inférieure non brillante.

Ligule non robuste, feuille relativement courtes, pas ou peu rugueuses

Ligule supérieure pointue et longue (1–4 mm)

Agrostide stolonifère
Avec stolons aériens et pousses couchées.

Agrostide blanche
Sans stolons aériens ni pousses couchées.

Ligule coupée (0,5 –1,5 mm). Feuille vert mat.

Agrostide capillaire
Feuilles un peu rugueuses, en général < 12 cm.

0 1 2 3 cm

V = Feuille la plus jeune pliée

= Feuille la plus jeune enroulée