

Clé de détermination des principales légumineuses au stade végétatif

Attention: pour la détermination n'utiliser que des exemplaires au stade végétatif, lors de la floraison, l'apparence des feuilles se modifie (folioles plus allongées)



Feuille à trois folioles (sans les stipules)



Foliole médiant sans pétiole

Stipules différents des folioles

Feuille sans poils

Trèfle blanc



Prairies naturelles et temporaires

Extrémité de la foliole non dentée, sans pivot, avec stolons


Feuille poilue



Longueur de la foliole 1–2 fois sa largeur. stipules avec poils à l'extrémité, feuille poilue, gris feutré en dessous

Trèfle de Perse

Chez les jeunes plantes les folioles sont rondes, chez les plantes bien développées, elles sont allongées et pointues



Prairies temporaires et cultures dérobées

Bords des folioles régulièrement dentés, racine pivot, sans stolon

Stipules identiques aux folioles

Lotier corniculé



Prairies et pâturages extensifs, pâturages alpestres, prairies temporaires extensives

Les stipules ressemblent aux folioles



avec pétiole

Luzerne



Folioles allongées > 15 mm, jeunes folioles souvent plus rondes

Luzerne lupuline



Cultures dérobées
Prairies plutôt maigres

Folioles rondes à triangulaires < 15 mm




Imparipennée

sans vrille



Esparcette

Prairies permanentes séchardes, Pâturages alpestres, prairies artificielles très séchardes



Paripennée

avec vrille



Poisette cultivée

Cultures dérobées
5 à 8 paires de folioles larges de max. 10 mm



Seulement 2 folioles

Gesse des prés

Stipules en forme de pointe de flèche
Prairies permanentes plutôt extensives

Vesce des haies



Prairies permanentes plutôt extensives

4 à 8 paires de folioles larges de max. 12 mm

Vesce craque



Prairies permanentes plutôt extensives

(5) 8 à 12 paires de folioles, folioles étroites et pointues, larges de max. 12 mm

