

Caratteristiche delle *altre erbe* (parte 1, A – Ci..)

Altre erbe	Stato idrico del suolo			Fertilità del suolo, concimazione			Tipo di sfruttamento		Intensità di gestione				Valore foraggero				Nelle miscele foraggere	Utile agli insetti	Indicatrice SPB QII	Medicinale, utilizzata in cucina
	umido	fresco	siccitoso	elevata	media	bassa	sfalcio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva	buono	scarso, leggermente tossico	malerba, tossico	tappabuchi				
Achillea millefoglie <i>Achillea millefolium</i>		●	●	●	●		●	●		●	●		● ¹	●	●			●		●
Podagraria <i>Aegopodium podagraria</i>		●		●			●			●	●			● ¹				●		●
Bugula (iva comune) <i>Ajuga reptans</i>	●	●			●		●	●		●	●			●				●		
Erba ventagliana <i>Alchemilla vulgaris</i>	●	●		●	●		●	●		●	●		● ¹	●				●		●
Cerfoglio comune <i>Anthriscus sylvestris</i>	●	●		●			●			●	●			●	● ²			●		
Pratolina <i>Bellis perennis</i>	●	●		●	●		●	●	● ⁴					●		●				●
Calta palustre <i>Caltha palustris</i>	●			●	●		●	●			●	●				●	●		●	●
Campanula barbata <i>Campanula barbata</i>		●	●		●		●	●			●	●	●							●
Campanula bienne - <i>Campanula patula</i>		●	●		●		●			●	●		●				●	●	●	●
Campanula di Scheuchzer <i>Campanula scheuchzeri</i>		●	●		●	●	●	●		●	●		●				●	●	●	●
Borsa del pastore <i>Capsella bursa-pastoris</i>	●	●	●	●	●		●			●	●			●	●		●			●
Billeri dei prati <i>Cardamine pratensis</i>	●	●					●	●		●	●			●	●	●		●	●	●
Cumino dei prati <i>Carum carvi</i>		●		●			●	●		●	●		● ¹				●			●
Fiordaliso stoppione <i>Centaurea jacea</i>	●	●	●		●		●				●	●		●			●	●	●	●
Fiordaliso vedovino <i>Centaurea scabiosa</i>			●		●	●	●				●	●		●			●	●	●	●
Cerfoglio irsuto <i>Chaerophyllum hirsutum</i>	●	●		●	●		●			●	●			●	●					
Cardo campestre <i>Cirsium arvense</i>	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●		●		
Cardo giallastro <i>Cirsium oleraceum</i>	●			●	●		●			●	●		● ¹	●			●	●	●	●
Cardo spinosissimo <i>Cirsium spinosissimum</i>	●	●		● ³			●	● ³		●						●				

Legenda:

● = certo

○ = possibile

¹ in quantità moderata | ² ingombro notevole | ³ zone di stazionamento del bestiame |

⁴ sovrasfruttamento | ⁵ sottosfruttamento

Caratteristiche delle *altre erbe* (parte 2, Co.. – L)

Altre erbe	Stato idrico del suolo			Fertilità del suolo, concimazione			Tipo di sfruttamento		Intensità di gestione				Valore foraggero				Nelle miscele foraggere	Utile agli insetti	Indicatrice SPB QJI	Medicinale, utilizzata in cucina
	umido	fresco	siccitoso	elevata	media	bassa	sfalcio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva	buono	scaro, leggermente tossico	malerba, tossico	tappabuchi				
Colchico autunnale <i>Colchicum autumnale</i>	●		○		●		●	○			●	●			●	●		●		
Crepide dorato <i>Crepis aurea</i>		●			●		○	●			●		●					●		
Crepide bienne <i>Crepis biennis</i>		●			●		●				●			●			●	●	●	
Carota selvatica <i>Daucus carota</i>		●	●		●	○	●				●	●	● ¹	○			●	●	●	●
Felce maschio <i>Dryopteris filix-mas</i>		●				●		●				○	● ⁵		●	●				○
Equiseto palustre <i>Equisetum palustre</i>	●				●		●	○			●	●			●	●				
Cespica annua <i>Erigeron annuus</i>	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●			●	●				
Caglio bianco <i>Galium album</i>	●	●	●	●	●		●				●	○		●				●		●
Genziana maggiore <i>Gentiana lutea</i>		●	●		○	●	○	●			○	●		●						●
Geranio silvano <i>Geranium sylvaticum</i>	●	●		● ³	○		●	● ³			●	● ⁵		● ²				●		
Edera terrestre <i>Glechoma hederacea</i>	●	●		●	●		●			●	●			●	○	●		●		●
Spondiglio comune <i>Heracleum sphondylium</i>	○	●	○	●	○		●			●	●		● ¹	○				●		●
Ambretta comune <i>Knautia arvensis</i>		●	●		●	●	●				●			●			●	●	●	○
Leontodo ramoso <i>Leontodon autumnalis</i>		●		●	●		○	●		●	○		●				●	●	●	
Leontodo comune <i>Leontodon hispidus</i>	●	●	●		●		●	●		○	●		●				●	●	●	
Margherita <i>Leucanthemum vulgare</i>	○	●	●			●	●				●	●		●			●		●	
Erba mutellina <i>Ligusticum mutellina</i>	○	●	○	○	●	○	●	●	○	●	●		●					●		●

Legenda:

● = certo

○ = possibile

¹ in quantità moderata | ² ingombro notevole | ³ zone di stazionamento del bestiame |

⁴ sovrasfruttamento | ⁵ sottosfruttamento

Caratteristiche delle *altre erbe* (parte 3, P – Rh..)

Altre erbe	Stato idrico del suolo			Fertilità del suolo, concimazione			Tipo di sfruttamento		Intensità di gestione				Valore foraggero				Nelle miscele foraggere	Utile agli insetti	Indicatrice SPB QII	Medicinale, utilizzata in cucina
	umido	fresco	siccitoso	elevata	media	bassa	sfalcio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva	buono	scarsa, leggermente tossico	maleirba, tossico	tappabuchi				
Tragoselino maggiore <i>Pimpinella major</i>	○	●	○		●		●				●		●	○			●	●		●
Piantaggine alpina <i>Plantago alpina</i>		●			○	●		●			●	●	●				●	●		
Piantaggine nera <i>Plantago atrata</i>		●			●		○	●			●		●					●		
Piantaggine lanceolata <i>Plantago lanceolata</i>	○	●	●		●	○	●	○		●	●		● ¹	○		○	●	○		●
Piantaggine maggiore <i>Plantago major</i>	○	●		●	●			● ³	● ⁴					●	○ ²	●		●		●
Piantaggine media <i>Plantago media</i>		●	●		○	●	●	●		○ ⁴	●			●	○ ²		●	●		●
Poligono bistorta <i>Polygonum bistorta</i>	●	○		●	○		●			●	○		● ¹	○	○ ²			○		●
Cinquefoglie tormentilla <i>Potentilla erecta</i>	○	●	●			●	●	●			●	●		●				●		●
Cinquefoglie comune <i>Potentilla reptans</i>	○	●		○	●		●	●		●				●		●		●		○
Piantaggine media <i>Prunella vulgaris</i>	●	●			●		●	●	○	●	●		●				●			○
Felce aquilina <i>Pteridium aquilinum</i>	●	●	●		○	●		●		○		● ⁵			●	●				
Ranuncolo a foglie d'aconito <i>Ranunculus acronitifolius</i>	●			●			●	○		●	○			●	○ ²			○		●
Ranuncolo acre <i>Ranunculus acris</i>	●	●		●	●		●	●	●	○					●	○		●		○
Ranuncolo bulboso <i>Ranunculus bulbosus</i>			●		○	●	●	○		●	●		○	●	○		●	●		●
Ranuncolo favagello <i>Ranunculus ficaria</i>	●	●		●	○		●	●	●	●					●	●		●		○
Ranuncolo strisciante <i>Ranunculus repens</i>	●	●		●	●		●	●	●	●			● ¹	○		●		●		
Cresta di gallo comune <i>Rhinanthus alectorolophus</i>		●			○	●	●			●	● ⁵			● ¹	○	●		●		●

Legenda: ● = certo ○ = possibile

¹ in quantità moderata | ² ingombro notevole | ³ zone di stazionamento del bestiame | ⁴ sovrasfruttamento | ⁵ sottosfruttamento

Caratteristiche delle *altre erbe* (parte 4, Ru.. – Z)

Altre erbe	Stato idrico del suolo			Fertilità del suolo, concimazione			Tipo di sfruttamento		Intensità di gestione				Valore foraggero				Nelle miscele foraggere	Utile agli insetti	Indicatrice SPB QII	Medicinale, utilizzata in cucina
	umido	fresco	siccitoso	elevata	media	bassa	sfaicio	pascolo	intensiva	medio intensiva	poco intensiva	estensiva	buono	scarsa, leggermente tossico	malerba, tossico	tappabuchi				
Romice acetosa <i>Rumex acetosa</i>	○	●	○		●		●	○		○	●			●				○		●
Romice alpino <i>Rumex alpinus</i>	○	●		● ³				● ³				○ ⁵			● ²			●		○
Romice comune <i>Rumex obtusifolius</i>	●	●	○	●	○		●	○	● ⁴	●			○	○	● ²	●		○		
Salvia dei prati <i>Salvia pratensis</i>			●		○	●	●	○			●	●		●			●	●	●	●
Salvastrella minore <i>Sanguisorba minor</i>			●			●	●				○	●		● ¹			●	●	●	●
Salvastrella maggiore <i>Sanguisorba officinalis</i>	●	○		○	●		●	○			●			● ¹			●	●	●	●
Vedovina selvatica <i>Scabiosa columbaria</i>	○	○	●			●	●				○	●		●			●	●	●	
Senecione alpino <i>Senecio alpinus</i>	●	●		● ³				● ³				○ ⁵			●	●				
Senecione di San Giacomo <i>Senecio jacobaea</i>		●	○		●	○	●	●				○	●		●	●			●	
Silene dioica <i>Silene dioica</i>	○	●		●	●		●				●			● ¹			●	●		○
Fior di cuculo <i>Silene flos-cuculi</i>	●	○		○	●		●			○	●			● ¹			●	●	●	○
Silene rigonfia (bubbolini) <i>Silene vulgaris</i>		●	●		●	○	●				●	○		● ¹			●	●	●	○
Centocchio comune <i>Stellaria media</i>	●	●		●			●		● ⁴					● ¹		●				●
Consolida maggiore <i>Symphytum officinale</i>	●	●		●	○		●				●			● ¹ ○				●		●
Dente di leone <i>Taraxacum officinale</i>	●	●	●	●	●		●	●	●	●	○		●			●		●	●	●
Barba di becco <i>Tragopogon pratensis</i>		●		●	●		●	○			●		○	●			●	○	●	
Ortica comune <i>Urtica dioica</i>	●	●		● ³	○			● ³				○ ⁵	○	○	○ ²			●		●
Veratro bianco <i>Veratrum album</i>	●	●		○	●		○	●			●	●			●	●		●		○
Veronica filiforme <i>Veronica filiformis</i>	●	●		●	●		●	●	● ⁴						●	●				

Legenda:

● = certo

○ = possibile

¹ in quantità moderata | ² ingombro notevole | ³ zone di stazionamento del bestiame |
⁴ sovrasfruttamento | ⁵ sottosfruttamento