





























Chiave di determinazione delle principali «altre erbe» allo stadio vegetativo

Attenzione: per la determinazione usare solo le foglie alla base della pianta!

① Piante simili alle graminacee	② Foglie verticillate	③ Foglie composte da più foglioline		④ Foglie semplici (ev. fortemente incise, ma non suddivise in foglioline)			
				Foglie con nervature <u>parallele</u>		Foglie con nervature <u>non parallele</u>	
					Foglie che si <u>restringono</u> sul picciolo	Foglie che <u>non si restringono</u> sul picciolo	Foglie fortemente incise
Giunchi <i>Juncus spp.;</i> <i>Luzula spp.</i>  Fusto tubolare, senza nodi né foglie.	Coda cavallina <i>Equisetum palustre</i> Pianta tossica 	Cerfoglio comune <i>Anthriscus sylvestris</i> 	Spondiglio comune <i>Heraclium spondylium</i> 	Piantaggine lanceolata <i>Plantago lanceolata</i> 	Dente di leone <i>Taraxacum officinale</i> Peduncolo florale tubolare, cavo. 	Romice acetosa <i>Rumex acetosa</i> Sapore acidulo. 	Ranuncolo acre <i>Ranunculus acer et friesianus</i> Foglia con 3 – 5 lobi, pianta tossica allo stato fresco. 
		Cerfoglio irsuto <i>Chaerophyllum hirsutum</i> 	Ranuncolo strisciante <i>Ranunculus repens</i> Foglioline picciolate 	Piantaggine media <i>Plantago media</i> Rosetta aderente al terreno, foglia larga, senza picciolo, pelosa. 	Leontodo comune <i>Leontodon hispidus</i> Peduncolo florale sottile e pieno. 	Romice comune <i>Rumex obtusifolius</i> Principale infestante di prati e pascoli. 	
Carici <i>Carex spp.;</i> <i>Eriophorum spp.</i>  Fusto tagliente, senza nodi, di solito triangolare.	Cagliolo <i>Gallium mollugo</i> 	Podagraria <i>Aegopodium podagraria</i> 	Achillea millefoglie <i>Achillea millefolium</i> 	Piantaggine maggiore <i>Plantago major</i> Foglia larga <u>con</u> picciolo. 	Margherita <i>Leucanthemum vulgare</i> 	Salvia dei prati <i>Salvia pratensis</i> Terreni magri e siccitosi. 	Geranio silvano <i>Geranium silvaticum</i> 
Lisca dei prati <i>Scirpus sylvaticus</i> Fusto come quello dei carici, ma con foglie larghe.	Caglio zolfino <i>Gallium verum</i> 	Cumino dei prati <i>Carum carvi</i> 		Colchico autunnale <i>Colchicum autumnale</i> Molto tossico, fiore violetto che appare in autunno, nei pascoli sottosfruttati. 	Cardo giallastro <i>Cirsium oleraceum</i> giovane  adulto 	Erba ventagliana <i>Alchemilla vulgaris</i> Pianta «raccolti-rugiada». 	Pianta pelosa 